SUIVI DES EFFETS DE LA MÉDICATION

VERSION POUR PARENTS

OBJECTIF: Assurer un suivi des changements au niveau du comportement, de l'état et des habitudes de vie de l'enfant à la suite de l'intégration d'une médication, afin de s'assurer que la réponse de l'enfant est adéquate.

changement amélioration amélioration absent* Face a ux devoirs, votre enfant concentre davantage mble moins distrait par les stimuli externes ou moins factique rvient mieux à terminer ses tâches moins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'inattention t moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action moins tendance à éparpiller ses choses mole avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux popilisés ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche moile moins découragé par les difficultés intre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits A unive au de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité "plus calme, moins agité "moins excitable "applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: Replisur sol Présence d'effets secondaires Replisur sol Pleurs/tristesse Tics	nom de l'enfant				âge	date	date	
concentre davantage mble moins distrait par les stimuli externes ou moins latique livient mieux à terminer ses tâches moins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'inattention limieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action moins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux popilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés intre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité limitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: l'adappétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Replisur soi Pleurs/tristesse Tics	nom du m	nédicament	do	se	date début			
concentre davantage mble moins distrait par les stimuli externes ou moins latique rvient mieux à terminer ses tâches noins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'Inattention moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant t plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: Regard vide Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pieurstristesse Tics							Comportement absent*	
mble moins distrait par les stimuli externes ou moins natique vient mieux à terminer ses tâches noins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'inattention moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mible avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux poblisés ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mible moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits A u niveau de l'activité motrice, votre enfant et plus calme, moins agité *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pleurs/tristessee Tics Tics		Face au	x devo	irs, vot	tre enfa	n t		
revient mieux à terminer ses tâches moins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'inattention Dans ses capacités d'organisation, votre enfant revient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux poblisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés contre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Repli sur soi Tics	e concentre dav	antage						
rvient mieux à terminer ses tâches noins besoin de support (fonctionne mieux seul) t moins d'erreurs d'inattention moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appêtit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi pleurs/tristesse Tics	emble moins dis	strait par les stimuli externe	es ou moins					
noins besoin de support (fonctionne mieux seul) It moins d'erreurs d'inattention It moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant Invient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mible avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mible moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Auniveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Regii sur soi Tics	unatique							
t moins d'erreurs d'inattention moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant e plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Repli sur soi Fics								
moins réfractaire à l'effort Dans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) comis impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Auniveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité emoins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appêtit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi pleurs/tristesse Tics			ux seul)					
Pans ses capacités d'organisation, votre enfant rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) contre moins d'opposition (active ou passive) company impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant ci plus calme, moins agité company impulsif se moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: Regard vide Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pieurs/tristesse Tics								
rvient mieux à mener à bien ses routines otidiennes ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action noins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés contre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant et plus calme, moins agité temoins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pleurs/tristesse Tics			tés d'o	rganisat	tion, votr	e enfant		
ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action moins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi prosité Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics								
ussi davantage à prêter attention aux consignes cessite moins de rappels pour se mettre en action moins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: et d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi prosité Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	uotidiennes				_	_		
moins tendance à éparpiller ses choses mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Auniveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable	Réussi davantage	à prêter attention aux con	isignes					
mble avoir gagné en autonomie ctive davantage, est mieux pobilisé ses attitudes, votre enfant montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable	lécessite moins	de rappels pour se mettre	en action					
montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pleurs/tristesse Tics	moins tendance	e à éparpiller ses choses						
montre plus persévérant face à la tâche mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant s plus calme, moins agité c moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi e d'appétit Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	emble avoir gag	né en autonomie						
mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable	active davantag	e, est mieux p obilisé s e	s attit	udes, v	otre enfa	n t		
mble moins découragé par les difficultés ontre moins d'opposition (active ou passive) c moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant c plus calme, moins agité c moins excitable	e montre nlus n	ersévérant face à la tâche						
entre moins d'opposition (active ou passive) I moins impulsif I specte davantage les règles de la maison I moins de conflits A u niveau de l'activité motrice, votre enfant I plus calme, moins agité I moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: I d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pleurs/tristesse Tics								
moins impulsif specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Pleurs/tristesse Tics			re)					
specte davantage les règles de la maison moins de conflits Au niveau de l'activité motrice, votre enfant s plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Regard vide Insomnie Maux de tête Pleurs/tristesse Tics			,					
plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Insomnie Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics								
plus calme, moins agité moins excitable *applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Insomnie Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	it moins de conf	^{lits} Auniveaude	l'activi	= ité motri	ce. votre	enfant		
*applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics								
*applicable si vous n'avez pas observé ce comportement, même avant l'introduction de la médication Présence d'effets secondaires: e d'appétit Maux de ventre Insomnie Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	st plus calme, m	oins agité						
Présence d'effets secondaires : e d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi Pleurs/tristesse Tics					A		Z 19 - 29	
e d'appétit Maux de ventre Insomnie Maux de tête Repli sur soi ervosité Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	*ap			·		ntroduction de la	a medication	
ervosité Regard vide Irritabilité Pleurs/tristesse Tics	rte d'appétit					Renl	i sur soi	
	Nervosité							
	itres notes							